

Naturaktive borgere får naturhandleplaner

Nymindegab Græsningslaug



Foreningen, arealbeskrivelse og udpegninger

Nymindegab Græsningslaug havde stiftende generalforsamling i 2012 på initiativ af en lokal borger, Bent Poulsen, og et ønske hos NST om afgræsning af et engområde og bekæmpelse af rynket rose i klitter. Den oprindelige engfold er på 16 ha. Dertil kommer i 2015 og 2016 seks folde omgivet af stier i klitterne på i alt ca. 100 ha. NST har forberedt klitområdet med hegning og afbrænding af bl.a. havtorn. Lauget har pt. 60 lokale familier som medlemmer, der hver ejer et konkret antal moderfår med afkom. Foreningen har i 2016 ca. 100 moderfår med afkom og er et græsningsfællesskab, der ud over naturplejen og kødet også har det lokale fællesskab som målsætning. Medlemmerne betaler selv for deres dyrs vinterophold hos en lokal landmand.

Græsningslauget laver naturpleje med får af racen Spelsau. Medlemmerne er inddelt i tilsynsgrupper med en tovholder, der hver har vagt en uge ad gangen. Tovholder er kontakttled til næste gruppe. Da fårene læmmer i april/maj og engen kan være våd, kommer fårene inkl. lam først på engfolden ca. 1. juni. Efter ca. 3 uger skiftes til klitfolde. Midt juli kommer dyrene igen på engfolden. Sæsonen slutter i klitfoldene. Dyrene hjemtages ca. 1. november, hvor nogle af fårene/lam slagtes. Der er naturligt vand i engfolden og vandkar i klitfoldene. NST supplerer plejen i engfolden med slåning af lysesiv, fældning af glansbladet hæg og bjergfyr, og periodevis græsning med 6 Galloway stude, hvis græsset vokser fra fårene om foråret. Foreningen er under udvikling, bl.a. planlægges græsning med beder i vinterperioden i klitfoldene og separat græsning med gimmer i klitfolde.

Engfolden er beskyttet mose. Klitfoldene er beskyttet under klitfredningen. Alle foldene er en del af Natura 2000 område (både Habitat- og Fuglebeskyttelsesområde).




Fig. 1. Markering af laugets engfold og de 6 klitfolde. Hele området er habitat- og Fuglebeskyttelsesområde.

Angivelse af §3 beskyttet natur (brun er mose, lilla er hede) og markblokke (gule). Engfolden er §3 mose, mens klitfoldene er beskyttet af klitfredningen.

Kilde Arealinfo 2016.




Fig. 2. High Nature Value (HVN).

Højeste karakter er 11 (mørke røde områder). Der indgår både planteregistreringer og registrering af to rødlistede/habitat arter.

Området er Natura2000. Derfor er ansøgning om tilskud uafhængig af HNV. Arealinfo: Aug. 2016.

Arealet er besøgt den 26. august 2016 af naturkonsulent Anna Bodil Hald fra Natur & Landbrug ApS, sammen med formanden for Nymindegab Græsningslaug, Pia Jessen. Desuden deltog fra NST Ole Knudsen og en studerende.

Det største naturpotentiale findes på engfolden, som også inkluderer noget grå klit med gode arter som smalbladet timian. I engen sås gode arter fra mesotrof eng bl.a. vand-mynte, engkabbeleje, trævlekrone, kragefod, engviol, vandnavle, smalbladet kæruld, klokkelyng, mosebølle og klit-siv samt gode strandengsarter som jordbærkløver og knude-firling. NST har nedskåret en del grå-pil i engfolden. Klitfoldene er domineret af hjælme med større eller mindre områder dækket af rynket rose.



Foreningens formand, Pia Jessen, flankeret af medarbejdere fra NST og med Spelsau får i baggrunden.



I klitterne skal fårene bekæmpe bestande af rynket rose. Rynket rose har anden generation blomstrer i august



Fårene har i første græsningsrunde forhindret frugtsætning fra de første blomster på rynket rose.



Forslag til ansvarsarter: Trævlekrone i eng og smalbladet timian på grå klit, begge arter, der kræver at det lange græs er græsset i bund sidst på sæsonen.

Ansvarsarter: Trævlekrone i engfolden og smalbladet timian på grå klit.

Det betyder, at der skal være græsset i bund efterår, så de små planter får plads i solen.

Aktiviteter:

Engfolden: Sikre at engfolden holdes lysåben uden opvækst af grå-pil og andre vedplanter.

Sikre nedgræsning, dog med strukturmæssig mosaik, så trævlekrone og andre rosetplanter trives.

Græsningen i engfolden skal desuden stedvis sikre lavt græs og dermed levested for vibe og rødben.

Grå klit i engfolden: Holde øje med at revling ikke tager over i området. Evt. supplere med afbrænding i mosaik.

Klitfolde: På kort sigt sikre, at rynket rose ikke sætter frugter. På lang sigt, at rynket rose svækkes så meget at planterne går ud. Det gøres med græsning i foldskifte på tidspunkter hvor fårene æder blomster og blade (tidligt på sæson), samt blomster, evt. frugter og blade sidst på sæsonen. Gerne suppleret med vintergræsning. Den gradvis bekæmpelse giver nye gode klitarter en chance for at indvandre.